

ФЕРГОЛИН **NEW**

Гонадорелин 0,1 мг
Раствор для инъекций

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА И НОРМАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ АКТИВНЫЙ ГОНАДОРЕЛИН (ГнРГ)





Ферголин




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество мировых лидеров
- Высокая эффективность
- Экономичное применение
- Без ограничений на продукцию животноводства

ОПИСАНИЕ

Высококачественный гормон для повышения воспроизводства и нормализации репродуктивной функции коров, содержащий активный гонадотропин (ГнРГ).

СОСТАВ




0,1 мг гонадотропина ацетат

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ферголин относят к группе гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты. Гонадотропин (ГнРГ), входящий в состав лекарственного препарата, является синтетическим аналогом природного гормона гипоталамуса, который стимулирует высвобождение и секрецию из гипофиза гонадотропинов: фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов.

Фармакологические свойства препарата Ферголин связаны с совместным действием этих гормонов: ФСГ стимулирует образование и рост фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, а ЛГ является гормоном, ответственным за созревание фолликула, последующую овуляцию и контроль функции желтого тела. Внутримышечное введение препарата в рекомендованной дозе вызывает быстрое повышение уровней ЛГ и ФСГ в плазме крови, что способствует улучшению качества фолликулогенеза у самок животных. Из места введения гонадорелин быстро всасывается, период полувыведения из плазмы крови составляет около 20 минут. Гонадорелин метаболизируется до неактивных пептидов и аминокислот. Гонадорелин выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.

Эффективность препарата Ферголин при стимуляции и синхронизации полового цикла*




Эффективность препарата Ферголин при лечении фолликулярных кист




Эффективность препарата Ферголин при индукции овуляции

Эффективность препарата Ферголин в дозе 2,5 мл на голову



Эффективность препарата Ферголин в дозе 5 мл на голову



*на основе отчета об исследовании эффективности в условиях хозяйств

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ферголин применяют крупному рогатому скоту с целью стимуляции половой охоты, синхронизации полового цикла, индукции овуляции, лечения гипофункции яичников и фолликулярных кист, нормализации полового цикла у коров.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ферголин вводят глубоко внутримышечно с соблюдением правил асептики. Доза зависит от вида животного и показания к применению:

ПОКАЗАНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение фолликулярных кист и гипофункции яичников	5 мл	Однократно
Индукция овуляции перед осеменением	2,5 мл	Однократно
Стимуляция половой охоты и синхронизация полового цикла	1-2,5 мл	Однократно
Нормализация полового цикла (в послеродовой период)	1-2,5 мл	Однократно

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять препарат коровам на поздних сроках беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте WWW.NITA-FARM.RU

**Переходите в раздел сайта NITA-FARM:
В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ**



УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс. Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от NITA-FARM



WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.