



Инструкция по применению препарата КемТРЕЙС Хрома Пропионат

1. Описание препарата

Препарат КемТРЕЙС Хрома Пропионат 0,4 % производства компании Кемин является источником органического Хрома. Хром способствует активации рецепторов инсулина в клеточной мембране, тем самым усиливая транспорт глюкозы в клетки. Препарат применяется для профилактики снижения поедаемости рациона в послеродовой период и период теплового стресса летом. КемТРЕЙС улучшает использование энергии рациона. Это улучшает иммунитет и воспроизводительные функции, снижает вынужденную выбраковку и повышает молочную продуктивность коров.

2. Норма кормления

Стандартная дневная доза кормления Кемтрейс составляет 2-2,5 г/гол. в течение последних 2-3 недель перед отёлом и в период раздоя, оптимальная длительность применения первые 60 дней лактации.

3. Возможные техники применения КемТРЕЙС Хром

В составе минерально-витаминного премикса или комбикорма, содержащего Кемтрейс Хром.

В этом случае премикс должен содержать Кемтрейс, все необходимые макро-, микроэлементы и витамины. Дневная доза премикса или комбикорма должна содержать 2-2,5 г/гол. Кемтрейса Хрома (8-10 мг/гол. элементарного хрома). **Недопустимо превышение рекомендованной дозы кормления!** При несоблюдении нормы кормления положительный эффект хрома проявляется не полностью или снижается.

При любых вариантах кормления необходимо обеспечивать дневную потребность коров в витаминах, макро- и микроэлементах. Рекомендуемые нормы витаминов, макро- и микроэлементов приведены ниже.

Параметр	Единица кормления на гол./день	Рекомендуемая норма для сухостойных коров	Рекомендуемая норма для коров на раздое
Натрий	г	12	40
Кальций	г	40 *	160
Фосфор	г	30	100
Магний	г	16	40
Вит. А	тыс. ИЕ	80	150
Вит. Д	тыс. ИЕ	8	15
Вит. Е	мг	1000	500
Цинк	мг	600	1200
Марганец	мг	600	1200
Медь	мг	120	240
Молибден	мг	1,2	2,5
Иод	мг	6	12
Кобальд	мг	1,2	5
Селен	мг	3	5
Хром	мг	8	8-10

* Только при использовании системы дефицита кальция для профилактики родового пареза

2. Примерное количество продукта, необходимое на три месяца

В среднем 5 % коров в стаде находятся за 2-3 недели перед отёлом.

8 % в первые 30 дней лактации.

16 % в первые 60 дней лактации.

Пример: 1000 коров, 50 коров в предотельной группе, 160 коров на раздое (60 дней лактации)

210 гол. x 2,5 г x 90 дн. = 50 кг

При возникновении дополнительных вопросов по применению препарата КемТРЕЙС Хром просьба обращаться к Глухову Дмитрию по телефону +7-916-863-42-48, через приложения WhatsApp или Viber, либо по электронной почте dmitry.glukhov@kemin.com.